



## Att ta sprutor själv

Du kan få lära dig att själv ta sprutor med blodförtunnande läkemedel i underhudsfettet (subkutant). Sprutan kan tas omväxlande på magen, lårens framsida och utsida och skinkornas övre och yttre del.

1. Tvätta händerna.
  2. Ta ut sprutan ur förpackningen. Böj bort eventuellt stickskydd och ta bort nålskyddet.
  3. Nyp om huden du ska sticka i så att du får ett hudveck mellan fingrarna. Stick in hela nålen i 45–90 graders vinkel i mitten av hudvecket.
  4. Håll kvar greppet om huden och spruta långsamt in allt läkemedel som finns i sprutan.
  5. Dra ut sprutspetsen till hälften och räkna till fem. Dra sedan ut sprutan helt.
- Du kan få ett blåmärke efter att du har tagit sprutan. Det är normalt och ofarligt.



Lämpliga injektionsställen för blodförtunnande läkemedel är magen, lårens ovasida, höftens eller skinkornas utsida.



*Ta ett ordentligt tag i huden innan du sticker, så att du är säker på att injektionen hamnar i underhuden.*

- Se en film om att ta sprutor själv på [medicininstruktioner.se](https://www.medicininstruktioner.se). Sök på namnet på det läkemedel du har blivit ordinerad.