

## Behandling med blodförtunnande läkemedel

Blodförtunnande läkemedel gör att blodet inte kan levra sig, koagulera, som det brukar. Läkemedlen kallas även antikoagulantia.

Du kan få blodförtunnande läkemedel som förebyggande behandling om du har ökad risk för blodpropp. Risken för att få blodpropp kan öka vid operationer, men även av cancersjukdomen i sig.

Du kan även behöva ta blodförtunnande läkemedel på grund av tidigare sjukdomar som förmaksflimmer, hjärtsvikt, högt blodtryck eller diabetes.

### Olika typer av blodförtunnande läkemedel

Det finns olika typer av blodförtunnande läkemedel. Vilket du rekommenderas beror på vilken sjukdom du har och om du tar andra läkemedel. Ibland kan du behöva använda flera blodförtunnande läkemedel samtidigt, eller olika läkemedel under olika faser av behandlingen.

Blodförtunnande läkemedel finns som sprutor, tabletter eller kapslar.

### Biverkningar

Blodet koagulerar inte lika snabbt när du tar blodförtunnande läkemedel. Därför blöder du lättare om du till exempel får ett sår eller en skada. Vanliga biverkningar är

- näsblod
- blod i urinen
- blod i avföringen som gör den svart
- många eller stora blåmärken i huden.

Risken för allvarlig blödning minskar om du har ett normalt blodtryck.

Du kan tillfälligt behöva sluta ta det blodförtunnande läkemedlet eller ändra dosen, om du ska opereras, gå igenom olika undersökningar eller behandlas hos tandläkare.

### När ska jag kontakta vården?

- Om du blöder mycket eller om blödningen inte slutar, kontakta din behandlande mottagning. Du kan behöva ändra din dos.
- Om du ska vaccinera dig, prata först med din läkare.