


Borttagande av penis – total penisamputation

Vid mer avancerad peniscancer kan det vara nödvändigt att operera bort hela penis och delar av huden runt omkring. Operationen kallas total penisamputation.



Mannens bäckenbotten i genomskärning.

Så går det till

Du är sövd under operationen.

Kirurgen opererar bort hela penis och tar bort en del av pungens hud, så att pungen lyfts upp lite. Sedan sys såret ihop.

En ny urinrörsmynning skapas mellan pungen och analöppningen genom att kirurgen syr fast urinröret mot huden.

Du får en kateter, alltså en slang genom urinröret till urinblåsan. Katetern samlar upp din urin i en påse.

Eventuellt får du också ett dränage, alltså en slang in i operationsområdet för att leda ut sårsvätska och blod.

Hur mår jag efteråt?

Efter operationen är du kvar på sjukhuset i 1–5 dygn. Du kan behöva stanna längre om man gör flera ingrepp under samma operation.

På sjukhuset får du sprutor med blodförtunnande medicin för att minska risken för blodpropp.

Katetern tas bort 1–7 dagar efter operationen. Om du har kvar urinkatetern när du lämnar sjukhuset får du veta hur du sköter den, hur länge du ska ha den kvar och var den tas bort.

Dränaget tas oftast bort dagen efter operationen. Om du har dränaget kvar när du ska lämna sjukhuset får du veta hur du sköter det.

Det är vanligt att urinstrålen påverkas efter operationen och att många väljer att sitta och kissa.

Din förmåga att hålla kvar urinen i blåsan försämras inte av operationen.

3. BEHANDLING

Operation

Sjukskrivning

Det är vanligt att vara sjukskriven i 3–6 veckor efter operationen. Hur länge du behöver vara sjukskriven beror bland annat på vad du arbetar med och hur du mår.

Uppföljning

Cirka 2–4 veckor efter operationen blir du kallad antingen ett återbesök eller ett telefonsamtal. Då är analysen av vävnadsproverna som togs under operationen klar. Man har också haft en multidisciplinär konferens, MDK.

Återbesöket är oftast på det sjukhus där du opererades. Om resvägen är lång kan det vara på ditt hemsjukhus.

När ska jag kontakta vården?

- Om du får feber över 38 grader eller sämre allmäntillstånd under de första veckorna. Om du får över 40 graders feber, kontakta din närmaste akutmottagning.
- Om du har smärta som inte lindras av smärtstillande medicin eller om smärtan blir värre.
- Om såret blir mer svullet eller rött.