

Hudbehandling vid förstadium till peniscancer

Förstadium till peniscancer kan man operera, men det finns också flera hudbehandlingar. De kallas även dermatologiska behandlingar.

De hudbehandlingar som finns är

- behandling med kräm
- kryobehandling
- fotodynamisk behandling.

En hudläkare bedömer om någon av dessa kan passa för dig, och i så fall vilken.

Alla hudbehandlingar förstör de sjuka hudcellerna, vilket gör att sår bildas på det behandlade området. Sår är alltså ingen biverkan utan ett tecken på att behandlingen har fungerat som man tänkt. Såren läker när behandlingen avslutas.

Behandling med kräm

Du kan behandlas med krämen Efudix som innehåller fluorouracil. Det är en lokalt verkande celldödande kräm. Den smörjer du på förändringen varje dag i 4–6 veckor.

En annan behandling är med krämen Aldara som innehåller imikvimod, ett ämne som får immunförsvaret att bekämpa cancercellerna. Den smörjer du på förändringen 5 dagar per vecka, i 4–6 veckor.

Kryobehandling

Kryobehandling innebär att man fryser förändringen med flytande kväve så att cancercellerna dör. Behandlingen går snabbt, men kan ge ett sår som tar flera veckor att läka.

Fotodynamisk behandling

Fotodynamisk behandling är en sorts ljusbehandling som du får på hudmottagningen, 2 gånger med 1 eller 2 veckors mellanrum.

Behandlingen kan göra ont och du får därför lokalbedövning.

Först får du en så kallad fotosensitiserande kräm på förändringen. Krämen ska sitta på i 3 timmar. Sedan lyser man på området som ska behandlas med en speciell lampa, som ger ett rött ljus. Det röda ljuset förstör cancercellerna