

Laserbehandling av tumör på penis

Vissa tumörer på penis kan tas bort med laser.

Målet är att ta bort all sjuk vävnad och så lite frisk vävnad som möjligt, och behålla funktionen och utseendet så bra det går. Hur mycket som behöver tas bort beror på tumörens placering och storlek.

Efter operationen mynnar urinröret ofta ut längre ner på penis.

Så går det till

Under operationen är du lokalbedövad. Det innebär att du är vaken och känner beröring men ingen smärta.

Kirurgen tar bort tumören med koldioxidlaser. Sårytan behandlas sedan med så kallad Nd:YAG-laser för att döda eventuella cancerceller som finns kvar.

Du får en kateter, alltså en slang via urinröret till urinblåsan. Katetern samlar upp din urin i en påse och gör det möjligt att lägga ett förband runt penis.

Hur mår jag efteråt?

Du kan få lämna sjukhuset samma dag som operationen. Du kan också få stanna kvar över natten, om det varit en större operation eller om du har lång resväg hem.

Sjukskrivning

Det är vanligt att vara sjukskriven i upp till 1 vecka efter operationen. Du kan sjukskriva dig själv från arbetet utan intyg i en vecka.

Katetern kan tas bort när förbandet har tagits bort och du kan kissa själv. Om du har katetern kvar när du lämnar sjukhuset får du veta hur du sköter den.

Uppföljning

Det är först när såret är läkt som man kan bedöma operationens resultat.

Cirka 2–4 veckor efter operationen blir du kallad till antingen ett återbesök eller ett telefonsamtal. Då är analysen av vävnadsproverna som togs under operationen klar. Man har också haft en nationell multidisciplinär konferens, MDK.

Återbesöket är oftast på det sjukhus där du opererades. Om resvägen är lång kan det vara på ditt hemsjukhus.

När ska jag kontakta vården?

- Om du får feber över 38 grader eller sämre allmäntillstånd under de första veckorna. Om du får över 40 graders feber, kontakta din närmaste akutmottagning.
- Om du har smärta som inte lindras av smärtstillande medicin eller om smärtan blir värre.
- Om såret blir mer svullet eller rött.