


Operation av lymfkörtlar i lilla bäckenet – pelvin lymfkörtelutrymning

Om sjukdomen har spridit sig till lymfkörtlarna behöver de opereras bort. Det kallas för lymfkörtelutrymning.

Om man behöver operera bort lymfkörtlarna i lilla bäckenet kallas det pelvin lymfkörtelutrymning. Lymfkörtlarna i lilla bäckenet kan opereras bort samtidigt som man opererar bort lymfkörtlarna i lumsken, eller efter det.



Lymfkörtlar i lilla bäckenet.

Förberedelser

Inför operationen kan du behöva få en spruta med blodförtunnande medicin för att minska risken för blodpropp, och antibiotika för att minska risken för infektion.

Så går det till

Du är sövd under operationen.

Kirurgen gör ett snitt nedanför naveln, och använder det för att ta bort lymfkörtlarna på insidan av bäckenet. Ibland görs ingreppet som en titthålsoperation och då görs istället flera mindre snitt i magen.

Såret eller såren försluts oftast med metallklamrar, så kallade agraffer.

Ibland får du ett dränage, alltså en slang via magen till området där lymfkörtlarna suttit. Dränaget leder ut sårvätska och blod från området.

Ibland får du också en kateter, alltså en slang via urinröret till urinblåsan. Katetern samlar upp din urin i en påse.

Hur mår jag efteråt?

Efter operationen är du kvar på sjukhuset i upp till 3 dagar. Tiden på sjukhuset kan bli längre om din läkare anser det nödvändigt.

Dränaget tas oftast bort inom något eller några dygn. Om du har dränaget kvar när du ska lämna sjukhuset får du veta hur du ska sköta det.

3. BEHANDLING Operation

Katetern tas oftast bort samma dag som operationen eller någon dag efter.

Innan du lämnar sjukhuset får du information om egenvård efter operationen.

Efter operationen ökar risken för proppbildningar i benen. Därför rekommenderas användning av kompressionsstrumpor vid längre stillasittande och att trampa med fötterna för att öka cirkulationen.

Sjukskrivning

Det är vanligt att vara sjukskriven i 4–6 veckor efter operationen. Hur länge du behöver vara sjukskriven beror bland annat på vad du arbetar med och hur du mår.

Uppföljning

Cirka 2–4 veckor efter operationen blir du kallad till antingen ett återbesök eller ett telefonsamtal. Då är analysen av vävnadsproverna som togs under operationen klar. Man har också haft en multidisciplinär konferens, MDK.

Återbesöket är oftast på det sjukhus där du opererades. Om resvägen är lång kan det vara på ditt hemsjukhus.

När ska jag kontakta vården?

- Om du får feber över 38 grader eller sämre allmäntillstånd under de första veckorna. Om du får över 40 graders feber, kontakta din närmaste akutmottagning.
- Om du har smärta som inte lindras av smärtstillande medicin eller om smärtan blir värre.
- Om såret blir mer svullet eller rött.