


## Operation av lymfkörtlar i ljumsken – modifierad lymfkörtelutrymning

Om sjukdomen misstänks ha spridit sig till lymfkörtlarna i ljumsken kan man behöva ta bort några av dem. Operationen kallas modifierad lymfkörtelutrymning och kan bota sjukdomen.



*Lymfkörtlar i ljumsken.*

### Förberedelser

Inför operationen kan du behöva få en spruta med blodförtunnande medicin för att minska risken för blodpropp, och antibiotika för att minska risken för infektion.

### Så går det till

Du är sövd under operationen.

Kirurgen gör ett snitt nedanför ljumsken, och genom det opereras några lymfkörtlar bort.

När lymfkörtlarna har tagits bort kommer lymfvätskan i benet att cirkulera sämre. För att lymfvätska inte ska samlas i såret får du ett dränage. Det är en tunn slang i sårområdet som samlar upp lymfvätskan i en påse.

Ibland får du också en kateter, alltså en slang via urinröret till urinblåsan. Katetern samlar upp din urin i en påse.

### Hur mår jag efteråt?

Om du har dränaget kvar när du lämnar sjukhuset får du veta hur du tar hand om det.

Katetern tas bort samma dag som operationen eller någon dag efter.

Du får åka hem från sjukhuset efter 1-2 dagar.

### Sjukskrivning

Det är vanligt att vara sjukskriven i cirka 4–6 veckor efter operationen. Hur länge du behöver vara sjukskriven beror bland annat på vad du arbetar med och hur du mår.

### Uppföljning

### 3. BEHANDLING Operation

Cirka 2–4 veckor efter operationen blir du kallad till antingen ett återbesök eller ett telefonsamtal. Då är analysen av vävnadsproverna som togs under operationen klar. Man har också haft en multidisciplinär konferens, MDK.

Återbesöket är oftast på det sjukhus där du opererades. Om resvägen är lång kan det vara på ditt hemsjukhus.

#### **När ska jag kontakta vården?**

- Om du får feber över 38 grader eller sämre allmäntillstånd under de första veckorna. Om du får över 40 graders feber, kontakta din närmaste akutmottagning.
- Om du har smärta som inte lindras av smärtstillande medicin eller om smärtan blir värre.
- Om såret blir mer svullet eller rött.