


Operation av lymfkörtlar i ljumsken – radikal inguinal lymfkörtelutrymning

Om sjukdomen har spridits till lymfkörtlarna i ljumsken kan man behöva ta bort dem. Det gäller också om man starkt misstänker spridning dit. Operationen kallas inguinal lymfkörtelutrymning och kan bota sjukdomen.



Lymfkörtlar i ljumsken.

Förberedelser

Inför operationen kan du behöva få en spruta med blodförtunnande medicin för att minska risken för blodpropp, och antibiotika för att minska risken för infektion.

Så går det till

Du är sövd under operationen.

Kirurgen gör ett snitt nedanför ljumsken, och genom det opereras lymfkörtlarna bort.

När lymfkörtlarna har tagits bort kommer lymfvätskan i benet att cirkulera sämre. För att lymfvätska inte ska samlas i såret får du ett dränage. Det är en tunn slang i sårområdet som samlar upp lymfvätskan i en påse.

Ibland får du också en kateter, alltså en slang via urinröret till urinblåsan. Katetern samlar upp din urin i en påse.

Hur mår jag efteråt?

Efter operationen är du kvar på sjukhuset i upp till 3 dagar. Tiden på sjukhuset kan bli längre om din läkare anser det nödvändigt.

Du får prova ut stödstrumpor som du ska ha på dig i upp till 6 månader efter operationen.

Innan du lämnar sjukhuset får du veta hur du ska sköta dränaget.

Katetern tas bort samma dag som operationen eller någon dag efter.

Sjukskrivning

3. BEHANDLING Operation

Det är vanligt att vara sjukskriven i cirka 4–6 veckor. Hur länge du behöver vara sjukskriven beror bland annat på vad du arbetar med och hur du mår.

Uppföljning

Cirka 2–4 veckor efter operationen blir du antingen kallad på ett återbesök eller ett telefonsamtal. Då är analysen av vävnadsproverna som togs under operationen klar. Man har också haft en nationell multidisciplinär konferens, MDK.

Återbesöket är oftast på det sjukhus där du opererades. Om resvägen är lång kan det vara på ditt hemsjukhus.

Efter operationen ökar risken för proppbildningar i benen. Därför rekommenderas användning av kompressionsstrumpor vid längre stillasittande och att trampa med fötterna för att öka cirkulationen.

När ska jag kontakta vården?

- Om du får feber över 38 grader eller sämre allmäntillstånd under de första veckorna. Om du får över 40 graders feber, kontakta din närmaste akutmottagning.
- Om du har smärta som inte lindras av smärtstillande medicin eller om smärtan blir värre.
- Om såret blir mer svullet eller rött.