


## Operation av ollonet – glansektomi

Om cancer är begränsad till ollonet kan ollonet opereras bort. Operationen kallas glansektomi.



*Mannens bäckenbotten i genomskärning.*

### **Så går det till**

Du blir sövd eller får ryggmärgsbedövning eller lokalbedövning.

Kirurgen opererar bort ollonet.

Man lämnar kvar svällkropparna som gör det möjligt att få erektion.

Du får en kateter, alltså en slang via urinröret till urinblåsan. Katetern samlar upp din urin i en påse.

Ett förband läggs runt penis.

### **Hur mår jag efteråt?**

Antingen kan du lämna sjukhuset samma dag eller så får du vara kvar i några dagar. Det beror på vad din läkare anser vara nödvändigt.

Förbandet bör sitta kvar i några timmar eller till nästa dag.

Katetern brukar tas bort efter 3–7 dagar. Om du har kvar katetern när du lämnar sjukhuset får du veta hur du sköter den, hur länge du ska ha den kvar och var den tas bort.

När du lämnar sjukhuset får du information om egenvård efter operationen.

Det är vanligt att urinstrålen påverkas efter operationen och att många väljer att sitta och kissa.

### **Sjukskrivning**

Det är vanligt att vara sjukskriven i upp till 1 vecka efter operationen. Du kan sjukskriva dig själv från arbetet utan intyg i en vecka.

### **Påverkan på sexualiteten**

Det är ovanligt att få sämre erektionsförmåga efter operationen. Däremot blir penis kortare och får mindre känsel.

## 3. BEHANDLING

### Operation

#### Uppföljning

Cirka 2–4 veckor efter operationen blir du kallad till antingen ett återbesök eller ett telefonsamtal. Då är analysen av vävnadsproverna som togs under operationen klar. Man har också haft en multidisciplinär konferens, MDK.

Återbesöket är oftast på det sjukhus där du opererades. Om resvägen är lång kan det vara på ditt hemsjukhus.

#### När ska jag kontakta vården?

- Om du får feber över 38 grader eller sämre allmäntillstånd under de första veckorna. Om du får över 40 graders feber, kontakta din närmaste akutmottagning.
- Om du har smärta som inte lindras av smärtstillande medicin eller om smärtan blir värre.
- Om såret blir mer svullet eller rött.