

Operation av tumör genom excision

Vissa tumörer på penis kan behandlas genom att tumören skärs bort. Operationen kallas excision.

Målet är att ta bort all sjuk vävnad och så lite frisk vävnad som möjligt, och behålla funktionen och utseendet på penis så bra det går. Hur mycket som behöver tas bort beror på tumörens placering och storlek.

Så går det till

Under operationen är du lokalbedövad. Det innebär att du är vaken och känner beröring men ingen smärta.

Kirurgen skär bort tumören.

Du får en kateter, alltså en slang via urinröret till urinblåsan. Katetern samlar upp din urin i en påse.

Hur mår jag efteråt?

Du kan få lämna sjukhuset samma dag. Du kan också få stanna kvar över natten, om resvägen är lång eller om din läkare anser det vara nödvändigt.

Katetern brukar tas bort efter några dagar. Om du kvar katetern när du lämnar sjukhuset får du veta hur du sköter den, hur länge du ska ha den kvar och var den tas bort.

Sjukskrivning

Det är vanligt att vara sjukskriven i upp till 1 vecka efter operationen. Du kan sjukskriva dig själv från arbetet utan intyg i en vecka.

Uppföljning

Cirka 2–4 veckor efter operationen blir du kallad till antingen ett återbesök eller ett telefonsamtal. Då är analysen av vävnadsproverna som togs under operationen klar. Man har också haft en nationell multidisciplinär konferens, MDK.

Återbesöket är oftast på det sjukhus där du opererades. Om resvägen är lång kan det vara på ditt hemsjukhus.

När ska jag kontakta vården?

- Om du får feber över 38 grader eller sämre allmäntillstånd under de första veckorna. Om du får över 40 graders feber, kontakta din närmaste akutmottagning.
- Om du har smärta som inte lindras av smärtstillande medicin eller om smärtan blir värre.
- Om såret blir mer svullet eller rött.