


## Operation och återskapande av ollonet – glansektomi med neoglans

Om cancer växer i ollonet kan ollonet opereras bort och ersättas av hud från låret. Operationen kallas glansektomi med neoglans.



*Mannens bäckenbotten i genomskärning.*

### Så går det till

Du är sövd under operationen.

Kirurgen opererar bort ollonet och ersätter det med hud från utsidan av låret.

Man lämnar kvar svällkropparna som gör det möjligt att få erektion.

Du får en kateter, alltså en slang via urinröret till urinblåsan. Katetern samlar upp din urin i en påse.

Penis och området på låret där huden tagits läggs om med ett förband.

### Hur mår jag efteråt?

Efter operationen är du kvar på sjukhuset i upp till 5 dygn. Under tiden kan du behöva få sprutor med blodförtunnande medicin för att minska risken för blodpropp. Du kan i vissa fall även behöva antibiotika.

Katetern brukar tas bort efter 3–7 dagar. Om du har kvar katetern när du lämnar sjukhuset får du veta hur du sköter den, hur länge du ska ha den kvar och var den tas bort.

När du lämnar sjukhuset får du information om egenvård efter operationen.

Det är vanligt att urinstrålen påverkas efter operationen och att många väljer att sitta och kissa.

### Sjukskrivning

Det är vanligt att vara sjukskriven i 4–6 veckor efter operationen. Hur länge du behöver vara sjukskriven beror bland annat på vad du arbetar med och hur du mår.

### Påverkan på sexualiteten

### 3. BEHANDLING Operation

Det är ovanligt att få sämre erektionsförmåga efter operationen. Däremot blir penis kortare och det nya ollonet har mindre känsel.

#### Uppföljning

Cirka 2–4 veckor efter operationen blir du kallad till antingen ett återbesök eller ett telefonsamtal. Då är analysen av vävnadsproverna som togs under operationen klar. Man har också haft en multidisciplinär konferens, MDK.

Återbesöket är oftast på det sjukhus där du opererades. Om resvägen är lång kan det vara på ditt hemsjukhus.

#### När ska jag kontakta vården?

- Om du får feber över 38 grader eller sämre allmäntillstånd under de första veckorna. Om du får över 40 graders feber, kontakta din närmaste akutmottagning.
- Om du har smärta som inte lindras av smärtstillande medicin eller om smärtan blir värre.
- Om såret blir mer svullet eller rött.