


Partiell penisamputation

Vid mer avancerad peniscancer kan det vara nödvändigt att operera bort en del av penis. Operationen kallas partiell penisamputation.



Mannens bäckenbotten i genomskärning.

Så går det till

Under operationen kan du vara lokalbedövad, ryggbedövad eller sövd.

Kirurgen tar bort ollonet och en del av svällkropparna som gör att du kan få erektion.

Man gör en ny urinrörsmynning. För att den ska kunna läka får du en kateter, alltså en slang via urinröret till urinblåsan. Katetern samlar upp din urin i en påse.

Ett förband läggs runt penis.

Hur mår jag efteråt?

Du kan lämna sjukhuset samma dag eller stanna kvar någon eller några nätter. Tiden på sjukhuset blir längre om till exempel lymfkörtlar har opererats bort eller om din läkare anser det vara nödvändigt. Du kan också få stanna över natten om du har lång resväg.

Förbandet sitter kvar i några timmar eller till nästa dag.

Katetern tas bort efter 3–7 dagar. Om du har kvar urinkatetern när du lämnar sjukhuset får du veta hur du sköter den, hur länge du ska ha den kvar och var den tas bort.

När du lämnar sjukhuset får du information om återhämtning och egenvård, och om hur du kommer att följas upp.

Det är vanligt att urinstrålen påverkas efter operationen och att många väljer att sitta och kissa.

Sjukskrivning

Det är vanligt att vara sjukskriven i 2–4 veckor efter operationen. Hur länge du behöver vara sjukskriven beror bland annat på vad du arbetar med och hur du mår.

Påverkan på sexualiteten

3. BEHANDLING Operation

Operationen kan minska erektionsförmågan. Den gör också att penis blir kortare och känslan i penis blir mindre.

Uppföljning

Cirka 2–4 veckor efter operationen blir du kallad till antingen ett återbesök eller ett telefonsamtal. Då är analysen av vävnadsproverna som togs under operationen klar. Man har också haft en multidisciplinär konferens, MDK.

Återbesöket är oftast på det sjukhus där du opererades. Om resvägen är lång kan det vara på ditt hemsjukhus.

När ska jag kontakta vården?

- Om du får feber över 38 grader eller sämre allmäntillstånd under de första veckorna. Om du får över 40 graders feber, kontakta din närmaste akutmottagning.
- Om du har smärta som inte lindras av smärtstillande medicin eller om smärtan blir värre.
- Om såret blir mer svullet eller rött.