

4. REHABILITERING OCH EGENVÅRD

Egenvård vid biverkningar och symtom

Hud och slemhinnor vid peniscancer

Vissa behandlingar och läkemedel kan ge besvär med hud och slemhinnor. Strålbehandling påverkar huden och slemhinnorna på den kroppsdel som strålbehandlas. Cytostatikabehandling kan påverka huden och slemhinnorna på hela kroppen.

Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare om du får besvär. Det finns läkemedel och andra sätt att lindra.

Råd för att förebygga och lindra besvär med hud och slemhinnor

Huden

- Smörj huden ofta med mjukgörande kräm, vid behov flera gånger om dagen.
- Tvätta huden med ljummet vatten och tvättolja eller mild tvål.
- Torka blöt hud genom att klappa med en handduk. Gnugga inte.
- Skydda huden mot solen under och efter behandlingen, en vecka efter avslutad cytostatikabehandling, och ett år efter avslutad strålbehandling.
 - Använd heltäckande kläder och hatt, och stanna i skuggan.
 - Du kan använda solskyddsmedel som komplement till kläder och skugga, men inte som enda solskydd. Använd solskyddsmedel med medelhög eller hög solskyddsfaktor.
 - Undvik solen när den är som starkast, klockan 11–15 under vår och sommar i Sverige, längre tid ju närmare ekvatorn du är.
- Använd rakapparat i stället för hyvel för att undvika skärsår.
- Bär gärna löst sittande kläder.
- Använd handskar vid arbete som är smutsigt eller sliter på händerna.
- Vid strålbehandling:
 - Bada helst inte under pågående behandling.
 - Använd inte parfymade produkter eller deodorant på området som strålbehandlas.

Munnen

- Var noga med munhygien och använd en mjuk tandborste och mild tandkräm.
- Var försiktig med tandtråd och tandpetare.
- För att lindra muntorrhet och förebygga munsvamp:
 - Använd salivstimulerande medel i form av sugtabletter, tuggummi, munsprej eller gel. De kan köpas på apotek.
 - Skölj munnen med mineralvatten som innehåller natriumbikarbonat, till exempel vichyvatten.

Näsan och ögonen

- Använd nässprej med olja eller koksaltlösning om du har torr näsa. De kan köpas på apotek.
- Använd smörjande ögondroppar om du har torra ögon. De kan köpas på apotek.
- Undvik kontaktlinser om du har besvär med ögonen.

Urinvägarna

Om det svider i urinröret kan det hjälpa att dricka upp till 1,5 liter per dygn.

4. REHABILITERING OCH EGENVÅRD

Egenvård vid biverkningar och symtom

Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har besvär med urinvägarna. Du kan behöva lämna prov för urinvägsinfektion.

► Läs mer på [1177.se](https://www.1177.se). Sök på Praktiskt stöd vid cancer