

## Caelyx/Paklitaxel (angiosarkom)

Caelyx	30 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 1 tim	Dag 1
Paklitaxel	80 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 1 tim	Dag 1, 8 och 15

Inför varje behandling: Blodstatus, Neutr.  
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Kur 1-2: Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT. Läkare ska vara tillgänglig de första 10 min av infusionstiden.

PVC fritt filter och aggregat till Paklitaxel.

Cykelintervall 28 dagar.  
Utvärderingsintervall: Datortomografi efter 3 cykler.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

**För att minska risken för akuta infusionsreaktioner skall kur 1 med Caelyx, och kur 1 och 2 med Paclitaxel ges enligt följande:** Starta infusionen med hastigheten 50 ml/timme under de första 15 minuterna. Om ingen reaktion uppträder ökas infusionshastigheten sedan under påföljande 15 min till den dubbla. Om ingen reaktion uppträtt under de första 30 minuterna ges resterande mängd infusion med ordinarie hastighet.

**Behandling vid en allergisk reaktion orsakat av Caelyx – se lokala instruktioner!**

OBS!! Dosreduktion får ej ske om provsvar äldre än 24 timmar.

### Dosreduktion:

B-Neutrofiler (x10 <sup>9</sup> /L)	B-TPK (x10 <sup>9</sup> /L)	Caelyx	Paklitaxel
>1,0	>100	100%	100%
1,0-0,5	99-75	75%	75%
<0,5	<50	Beh. Uppskjutes en vecka	Beh. uppskjutes en vecka

**Den dominerade dosbegränsande biverkan är palmopplantar erytrodysese (PPE).**

Om PPE grad 1 vecka 4 ges Caelyx 100%.

Om PPE grad 2 vecka 4 så avvakta med dos till PPE 0-1 och då ges Caelyx 75% dos.

Om PPE grad 3 vecka 4 så avvakta med dos till PPE 0-1 och ge Caelyx 75% dos. Om kvarstående PPE grad 2-3 vecka 6, utsätt behandlingen.

Patienter med nedsatt leverfunktion: Vid bilirubin 26-50 µmol/L ge 75% av dos cykel 1, vid bilirubin > 50 µmol/L av dos ge 50% av dos cykel 1.

Var observant på hjärtfunktionen om patienten tidigare fått antracykliner, eller om kumulativa dosen överskrider motsvarande 550 mg/m<sup>2</sup> doxorubicin.