

## Yondelis 24 tim (sarcom)

Trabectedin (Yondelis)	1,5 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 24 tim	Dag 1
------------------------	-----------------------	---------------	-------

### Kriterier för fulldos 1:a cykeln:

Hb g/l	B-Neutrofiler (x10 <sup>9</sup> /L)	B-TPK (x10 <sup>9</sup> /L)	ALP	ALAT/ASAT	Alb g/l.
>90	>1,5	>100	<2,5 x Nv*	<2,5x Nv*	>25

och renalt clearance >30 ml/min.

\* Nv = Övre normalvärdesgräns.

### Reduktion av 1:a cykel:

- Om ett av ovan kriterier ej är uppfyllt ges startdos 1,2 mg/m<sup>2</sup>.
- Om tidigare högdos kemoterapi (ifosfamid, metotrexat eller med stamcellsstöd) el. strålbehandling till >25% av benmärg, ges startdos 1,0 mg/m<sup>2</sup>.
- Om två av ovan kriterier ej är uppfyllda ges startdos 1,0 mg/m<sup>2</sup>.

Prov före kur: Blodstatus, neutr, leverstatus, krea.  
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

OBS! Skall bara ges i central venös infart!  
Efter kur: Antiemetikaschema nr 3.

Cykelintervall 21 dagar.  
Utvärderingsintervall: Efter 3 cykler.

OBS!! Dosreduktion får ej ske om provsvar äldre än 24 timmar.

Dosreduktion:

B-Neutrofiler (x10 <sup>9</sup> /L)	B-TPK (x10 <sup>9</sup> /L)	Trabectedin (Yondelis)
>1,0	>100	100%
1,0-0,5	99-75	75%
<0,5	<50	Beh. Uppskjutes en v.