

BEP sid 1/3

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

BEP

(Testikelca)

Inf Bleomycin*	30 000 IE =totaldos	Dag 1, 5 och 15
Inf Etoposid	100 mg/m ²	Dag 1-5
Inf Cisplatin	20 mg/m ²	Dag 1-5

* max ackumulerados 300 000 IE om patienten ska opereras efter kur 4.

Inför kur 1: (Audiogram).**Inför varje kur:** Blodstatus, Neutr, Cystatin C, Krea.**Tumörmarkörer:** HCG, AFP tas dag 1, 5, 15.**Under kur:** Vikt x 2. Inj/T Furix 40 mg vid viktökning >2 kg.**Om** frossa och feber av Bleomycin trots steroider kan tabl Alvedon 1 g ges före behandlingen.**Om** GFR är <60 ml/min skall Bleomycin och Cisplatin reduceras enligt schema.**Cykelintervall:** 21 dagar.**Efter kur:** dvs dag 6: Antiemetikaschema nr 5.***OBS!!** Vid oförklarlig andfåddhet och/eller hosta skall Bleomycinpneumonit övervägas och Bleomycin inte ges. Vanligast i slutet av planerad behandling.

G-CSF ökar risken för Bleomycinutlöst pneumonit.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej**Ssk.sign Läk.sign****Po. tas 1 tim före behandling**

Vikt _____ kl _____

K Emend 125 mg po _____**T/Inj Ondansetron** 8 mg po/iv _____**T/Inj Betapred** 8 mg po/iv _____**Inf Ringer-acetat** 1000 ml iv. Inf.tid 2 tim _____

Start _____

Stopp _____

Inf Bleomycin 30 000 IE iv i 250 ml NaCl, inf tid 30 min _____

Start _____

Stopp _____

Inf Etoposid _____ mg iv i 1000 ml NaCl. Inf.tid 2 tim _____**Inf Cisplatin** _____ mg iv blandas i samma påse som Etoposid } _____

Start _____

Stopp _____

Varje beh.dygn gives ytterligare minst 2000 ml vätska po eller iv.

T/Inj Betapred 8 mg po/iv (ges ca 12 tim efter föregående Betapreddos) kl _____

Vikt _____ kl _____ Inj/T Furix 40 mg vid viktökning >2 kg _____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____

DAG 2	beställs till kl _____	Ssk.sign	Läk.sign
Po. tas 1 tim före behandling			
Vikt _____ kl _____			
T/Inj Ondansetron 8 mg po/iv		_____	_____
T/Inj Betapred 8 mg po/iv		_____	_____
Inf Ringer-acetat 1000 ml iv. Inf.tid 2 tim		_____	_____
	Start	_____	_____
	Stopp	_____	_____
Inf Etoposid _____ mg iv i 1000 ml NaCl. Inf.tid 2 tim	}	_____	_____
Inf Cisplatin _____ mg iv blandas i samma påse som Etoposid		_____	_____
	Start	_____	_____
	Stopp	_____	_____
Varje beh.dygn gives ytterligare minst 2000 ml vätska po eller iv.			
T/Inj Betapred 8 mg po/iv (ges ca 12 tim efter föregående Betapreddos) kl _____		_____	_____
Vikt _____ kl _____ Inj/T Furix 40 mg vid viktökning >2 kg		_____	_____

DAG 3	beställs till kl _____	Ssk.sign	Läk.sign
Po. tas 1 tim före behandling			
Vikt _____ kl _____			
K Emend 80 mg po		_____	_____
T/Inj Ondansetron 8 mg po/iv		_____	_____
T/Inj Betapred 8 mg po/iv		_____	_____
Inf Ringer-acetat 1000 ml iv. Inf.tid 2 tim		_____	_____
	Start	_____	_____
	Stopp	_____	_____
Inf Etoposid _____ mg iv i 1000 ml NaCl. Inf.tid 2 tim	}	_____	_____
Inf Cisplatin _____ mg iv blandas i samma påse som Etoposid		_____	_____
	Start	_____	_____
	Stopp	_____	_____
Varje beh.dygn gives ytterligare minst 2000 ml vätska po eller iv.			
T/Inj Betapred 8 mg po/iv (ges ca 12 tim efter föregående Betapreddos) kl _____		_____	_____
Vikt _____ kl _____ Inj/T Furix 40 mg vid viktökning >2 kg		_____	_____

DAG 4	beställs till kl _____	Ssk.sign	Läk.sign
Po. tas 1 tim före behandling			
Vikt _____ kl _____			
T/Inj Ondansetron 8 mg po/iv		_____	_____
T/Inj Betapred 8 mg po/iv		_____	_____
Inf Ringer-acetat 1000 ml iv. Inf.tid 2 tim		_____	_____
	Start	_____	_____
	Stopp	_____	_____
Inf Etoposid _____ mg iv i 1000 ml NaCl. Inf.tid 2 tim	}	_____	_____
Inf Cisplatin _____ mg iv blandas i samma påse som Etoposid		_____	_____
	Start	_____	_____
	Stopp	_____	_____
Varje beh.dygn gives ytterligare minst 2000 ml vätska po eller iv.			
T/Inj Betapred 8 mg po/iv (ges ca 12 tim efter föregående Betapreddos) kl _____		_____	_____
Vikt _____ kl _____ Inj/T Furix 40 mg vid viktökning >2 kg		_____	_____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____

DAG 5	beställs till kl _____	Ssk.sign	Läk.sign
Po. tas 1 tim före behandling			
Vikt _____	kl _____		
K Emend 80 mg po		_____	_____
T/Inj Ondansetron 8 mg po/iv		_____	_____
T/Inj Betapred 8 mg po/iv		_____	_____
Inf Ringer-acetat 1000 ml iv. Inf.tid 2 tim		_____	_____
	Start	_____	
	Stopp	_____	
Inf Bleomycin <u>30 000 IE</u> iv i 250 ml NaCl, inf tid 30 min		_____	_____
	Start	_____	
	Stopp	_____	
Inf Etoposid _____ mg iv i 1000 ml NaCl. Inf.tid 2 tim	}	_____	_____
Inf Cisplatin _____ mg iv blandas i samma påse som Etoposid			
	Start	_____	
	Stopp	_____	
Varje beh.dygn gives ytterligare minst 2000 ml vätska po eller iv.			
T/Inj Betapred 8 mg po/iv (ges ca 12 tim efter föregående Betapreddos) kl _____		_____	_____
Vikt _____	kl _____	Inj/T Furix 40 mg vid viktökning >2 kg	_____

Peroral profylax**Ssk.sign****Antiemetikaschema nr 5.****BEP dag 15**

Inf Bleomycin*	30 000 IE =totaldos	Dag 1, 5 och 15
Inf Etoposid	100 mg/m ²	Dag 1-5
Inf Cisplatin	20 mg/m ²	Dag 1-5
*max ackumulerados 300 000 IE om patienten ska opereras.		

Om frossa och feber av Bleomycin trots steroider kan tabl Alvedon 1 g ges före behandlingen
Cykelintervall 21 dagar

DAG 15 beställs till kl _____ avvakta ja nej**Ssk.sign Läk.sign**

Po. tas 1 tim före behandling			
T/Inj Betapred 8 mg po/iv		_____	_____
Inf Bleomycin <u>30 000 IE</u> iv i 250 ml NaCl, inf tid 30 min		_____	_____
	Start	_____	
	Stopp	_____	

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____