

Fertilitet vid behandling med cytostatika – hos kvinna

Fertiliteten kan försämrans av både cancersjukdomen och cancerbehandlingen. Ofta kommer fertiliteten tillbaka när behandlingen är slut.

Prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska om du planerar att skaffa barn. Innan behandlingen börjar kan de berätta hur fertiliteten kan påverkas och vilka konsekvenser som kan uppstå av behandlingen.

Fertilitet under och efter cytostatikabehandling

Om du ska strålbehandlas mot ändtarmen/bäckenregionen kommer östrogenproduktionen från dina äggstockar att upphöra på några dagar och du kommer i klimakteriet om du inte redan passerat det. Du blir då också infertil. Dessa förändringar är permanenta.

Cytostatikabehandlingen kan minska din produktion av könshormoner. Det kan leda till att dina menstruationer upphör.

Det är svårt att säga i förväg om du kommer att bli infertil av cytostatikabehandlingen. Men ju högre doser och ju äldre du är, desto större är risken.

Eftersom cytostatika kan skada fostret bör du inte bli gravid under behandlingen och minst 3 månader efteråt.

Det finns hjälp att få

Det går att frysa ner befruktade ägg. Fler provrörsbefruktningar med befruktade ägg lyckas, jämfört med obefruktade. Det går även att operera ut hela, eller delar av, äggstocken och frysa ner.

► Läs mer på [1177.se](https://www.1177.se). Sök på Fertiliteten efter cancerbehandling.