

Perifert inlagd central venkateter, PICC-line

En perifert inlagd central venkateter, PICC-line, är en tunn slang som läggs in i ett blodkärl i överarmen. I den kan du få läkemedel, blodtransfusioner, vätska eller näring direkt i blodet. Även blodprover kan tas från den. En PICC-line kan användas under en lång period, upp till flera månader.

Förberedelser

Du får en kallelse med information om hur du ska förbereda dig. Vanligtvis kan du ta mediciner och äta som vanligt.


Så går det till

Innan slangen förs in i ett blodkärl i överarmen får du lokalbedövning. Ibland används ett ultraljud som stöd. Ingreppet utförs av en sjuksköterska och tar cirka en timme. Ibland görs en röntgen för att kontrollera att din PICC-line ligger rätt och kan användas, vilket kan ta ytterligare några timmar.

Efteråt

Det kan blöda lite från insticksstället första dygnet efter att du har fått din PICC-line. Du behöver ett nytt förband om det blöder mycket. Kontakta då en vårdcentral, hemsjukvården eller den som lagt in din PICC-line. En gång i veckan behöver förbandet bytas och venkatetern spolas, och det görs antingen i samband med annan behandling eller på din vårdcentral.

Du kan använda armen som vanligt och det går bra att vara fysiskt aktiv och träna som du brukar. Undvik att bada och basta när du har en PICC-line, men det går bra att duscha. När du duschar behöver du skydda förbandet så att det inte lossnar från huden. Om förbandet lossnar ökar risken för infektion. Duschskydd finns att köpa på apotek.



Figur 1 PICC-line

När ska jag kontakta vården?

- Om du har infektionssymtom som feber, frossa eller svullnad vid insticksstället.
- Om det blöder från insticksstället.
- Om du har smärta, svullnad eller tyngdkänsla i den arm som PICC-linen sitter i.

► Läs mer på [1177.se](https://www.1177.se). Sök på PICC-line.