

Subkutan venport, SVP

En subkutan venport, SVP, är en central infart, en liten dosa med en tunn slang som opereras in under huden, oftast på bröstkorgen. I den kan du få läkemedel, blodtransfusioner, vätska eller näring direkt i blodet. Även blodprover kan tas från den. En venport kan användas under en lång period, från några månader till flera år.

Förberedelser

Du får en kallelse med information om hur du ska förbereda dig för operationen.

Så går det till

Du får lokalbedövning före operationen. Dosan opereras in under huden på bröstkorgen. Den är cirka 2–3 centimeter i diameter. Slangen, även kallad kateter, läggs oftast in i något av de större blodkärlen.

Efteråt

Bedövningen släpper efter cirka 3–4 timmar. Då kan det kännas ömt och göra ont i det opererade området. Du kan ta smärtstillande läkemedel.

Förbandet och eventuella stygn tas bort efter drygt en vecka. Du får hjälp med det av en sjuksköterska där du får behandling, på en vårdcentral eller i hemsjukvården.

Att ha en venport


Du får ett kort med dosans nummer och operationsdatum som du alltid ska ha med dig.

Du kan duscha som vanligt när du har en venport, men du ska inte bada eller bada bastu innan operationssåret är läkt eller när du har en nål i venporten.

När venporten inte används behöver den inte skötas om på något särskilt sätt. Skydda ärret mot solen det första året. Om du åker bil kan bilbältet skava där venporten sitter. Då kan du lägga en hopvikt handduk eller en liten kudde mellan bröstkorgen och bältet.

När du ska få behandling sätts en nål in i dosan. Nålen kan sitta i 5–7 dagar täckt av ett förband. Därefter byts nålen eller tas bort. Varje gång sjuksköterskan kopplar på eller ifrån ett dropp eller tar ett blodprov, kommer du få ligga ner så att luft inte kommer in i slangen. Sjuksköterskan kontrollerar att venporten fungerar som den ska innan den används.

Du och din läkare bestämmer tillsammans hur länge venporten ska sitta kvar. Den tas bort genom en liknande operation som när den sattes in.



Figur 1 Subkutan venport

När ska jag kontakta vården?

- Om du har infektionssymtom som feber, frossa eller svullnad vid operationsområdet.
- Om det blöder från operationssåret eller platsen för dosan.
- Om du har smärta eller tyngdkänsla i armen på samma sida av kroppen som dosan

► Läs mer på 1177.se. Sök på Subkutan venport.