

## Behandling av ändtarmscancer

De behandlingar som kan bli aktuella vid ändtarmscancer är operation, strålbehandling och cytostatika.

### Strålbehandling

Vid ändtarmscancer får du ibland strålbehandling mot tumören före operationen. Strålbehandlingen krymper tumören och minskar risken för återfall. Strålningen ges mot ett begränsat område på kroppen, precis där tumören finns.

Strålbehandlingen anpassas efter tumörens sätt att växa och hur avancerad tumören är.

Ibland ser man vid röntgenkontroll efter strålbehandlingen att tumören har försvunnit. I vissa fall kan man då avvakta med operation. I stället ingår du i ett noggrant övervakningsprogram.

### Operation

Oftast opererar man endast bort den del av ändtarmen där tumören sitter. Därefter kopplar man ihop tjocktarmen och ändtarmen igen, i en så kallad skarv eller anastomos. Du får oftast en avlastande stomi medan anastomoserna läker. Stomi är en öppning på magen där tarminnehållet leds ut till en påse. I vissa fall sitter tumören så nära ändtarmsöppningen att hela ändtarmen och ändtarmsöppningen måste opereras bort. Du får då en permanent stomi.

Du får mer information om stomi om det är aktuellt för dig.

### Cytostatika

I vissa fall av tarmcancer kan du behöva behandling med cytostatika. Cytostatika är ett samlingsnamn för en grupp läkemedel som är vanliga för att behandla cancer. Om du redan från början har en avancerad cancer börjar man ibland med cytostatikabehandling.

När man har opererat bort tumören undersöks den borttagna tarmdelen i mikroskop. Om man då ser att tumören har vuxit på ett sätt som ökar risken för att den har spridit sig, kan du rekommenderas tilläggsbehandling med cytostatika. Cytostatika avser att minska risken för att sjukdomen kommer tillbaka.

Om tumören inte går att operera bort, kan du få cytostatika för att lindra symtomen och bromsa tillväxten av cancercellerna.

Cytostatika får du direkt i blodet via dropp eller som tablett.