

Behandling med kortison

Kortison är vanligt som en del av behandlingen mot cancer.

Kortison används också för att lindra biverkningar av annan behandling. Du kan till exempel få kortison mot illamående när du får behandling. Kortison kan också vara smärtstillande genom att minska svullnaden omkring en tumör och på så sätt minska trycket på vävnaden och nerverna intill.

Det är vanligt att du får större aptit och känner dig piggare när du får kortison.

Ofta ges kortisonet som tabletter eller direkt i blodet.

Kortison behöver trappas in och ut i lagom takt. Om du tar tabletter är det därför viktigt att du följer schemat du får.

Biverkningar

Det är individuellt vilka biverkningar du får av behandlingen. Kortare behandlingar på några dagar upp till ett par veckor ger ofta färre och mindre allvarliga biverkningar än längre behandlingar.

Tillsammans med din läkare väger du risken för biverkningar mot fördelarna med behandlingen.

Vanliga biverkningar på kort sikt

- svårt att sova
- känsla av rastlöshet, "uppvarvad"
- högre blodsocker
- högre blodtryck.

Vanliga biverkningar vid längre användning

- svullnad i ansiktet och på bålén
- tunnare och rodnad hud
- benskörhet
- förtvinade muskler
- sämre sårhäkning
- sämre försvar mot infektioner.

När ska jag kontakta vården?

Om du får besvärliga biverkningar, kontakta din kontaktsjuksköterska eller läkare.