


Hartmanns operation

Hartmanns operation görs när tumören sitter i den nedersta delen av tjocktarmen eller i ändtarmen. Du får en stomi i stället för att tarmarna sys ihop efter att tumören har opererats bort.

Metoden är lämplig om du har andra sjukdomar som gör det för riskabelt att koppla ihop tarmen, eller om du har en svag slutmuskel i ändtarmsöppningen.



Mag-tarmkanalen före och efter Hartmanns operation.

Förberedelser

Du kommer att få information om hur du ska förbereda dig inför operationen.

En stomiterapeut kommer att markera var stomin bör sitta.

Så går det till

Kirurgen tar via titthålsoperation eller öppen operation bort den del av tarmen där tumören sitter, men kopplar inte ihop tarmen igen. Tjocktarmen läggs i stället upp på magen och du får en stomi. Den sista delen av ändtarmen lämnas kvar.

Stomin kan vara permanent eller tillfällig.

Efteråt

Eftersom du har kvar en del av din ändtarm, fortsätter den att producera sekret och slem även efter operationen. Det kan tömmas ut genom att du krystar på toaletten. De första veckorna kan det även komma lite blod. Om du behöver kan du använda en tunn binda som skydd. Vanligtvis minskar slemmet och sekretet med tiden.