



Kolektomi

Kolektomi innebär att hela tjocktarmen tas bort. Eventuellt får du en stomi.

Operationen är aktuell till exempel om du har flera tumörer på olika ställen i tarmen, eller om du tidigare har opererats för tjock- eller ändtarmscancer. En annan orsak kan vara att risken för nya tumörer i tjock- eller ändtarmen bedöms vara stor på grund av ärftlighet, eller att du har en inflammatorisk tarmsjukdom.



Mag-tarmkanalen före operationen.



Mag-tarmkanalen efter en kolektomi med ileostomi eller ileorektalanastomos.

3. BEHANDLING

Operation

Förberedelser

Du kommer att få information om hur du ska förbereda dig inför operationen.

En stomiterapeut kommer att markera var den eventuella stomin ska sitta.

Så går det till

Kirurgen kommer att via tithålsoperation eller öppen operation ta bort hela tjocktarmen. Ändtarmen lämnas ofta kvar, men ibland tas även den bort. Tunntarmen kopplas antingen ihop med ändtarmen (ileorektalanastomos) eller så läggs slutet på tunntarmen upp på magen och du får en stomi (ileostomi).

Efteråt

Om du har kvar en del av din ändtarm, fortsätter den att producera sekret och slem en tid efter operationen. Det kan tömmas ut genom att du krystar på toaletten. De första veckorna efter operationen kan det även komma lite blod. Om du behöver kan du använda en tunn binda som skydd. Vanligtvis minskar sekretet och slemmet med tiden.