



Rektumresektion

En rektumresektion görs när tumören sitter i den övre eller mellersta delen av ändtarmen.



Före operationen



Mag-tarmkanalen före och efter en rektumresektion med ihopkopplad tjocktarm och ändtarmsstump utan respektive med en loopileostomi

3. BEHANDLING

Operation

Förberedelser

Vid operationen behöver hela tjocktarmen vara tömd. Därför kommer du att få dricka ett laxeringsmedel dagen före operationen.

Ofta planerar man för en avlastande tunntarmsstomi (loopileostomi) i samband med operationen. En stomiterapeut kommer därför att markera var stomin ska sitta före operationen.

Så går det till

Kirurgen kommer att via titthålsoperation eller öppen operation ta bort ändtarmen tillsammans med tumören, men spara en liten bit av nedersta ändtarmen.

Tjocktarmen kopplas sedan ihop med den sparade biten av ändtarmen. Eftersom risken för läkningsproblem i ändtarmen är ganska stor, gör man ofta en stomi för att avlasta skarven medan den läker.

Efteråt

Stomin tas bort cirka 3–12 månader efter operationen. Innan stomin tas bort kommer du att röntgas för att man ska kontrollera att skarven har läkt. Om du rekommenderas cytostatika låter man oftast stomin vara kvar tills den behandlingen är avslutad.

Du kan uppleva att det kommer slem, sekret och även lite avföring via ändtarmen från den bortkopplade, vilande tjocktarmen. Du kan även känna trängningar till att tömma tarmen. Då kan du gå på toaletten som tidigare.