

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

FLIRI (Irinotekan + FLv)

(GI)

Inf Irinotekan	180 mg/m ²		Dag 1
Inj 5-FU	500 mg/m ²	(jämna 50-tal)	Dag 1 och 2
Inj Calciumfolinat	100 mg		Dag 1 och 2

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.
Cykelintervall: 14 dagar.
Efter kur: Antiemetikaschema nr 3.
Förse patienten med Loperamidschema.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign** **Läk.sign**

Inj Ondansetron 8 mg iv	_____	_____
Inj Betapred 4 mg iv	_____	_____
Inj Atropin 0.25 mg sc	_____	_____
Inf Irinotekan _____ mg iv i 250 ml NaCl Inf.tid 1 tim	_____	_____
	Start	_____
	Stopp	_____
Inj 5-FU _____ mg iv bolus Inj.tid 2-3 min	_____	_____
Efter 30 - 40 min:		
Inj Calciumfolinat <u>100 mg</u> iv bolus Inj.tid 2-5 min	_____	_____

DAG 2 beställs till kl _____ **Ssk.sign** **Läk.sign**

Inj Ondansetron 8 mg iv	_____	_____
Inj Betapred 4 mg iv	_____	_____
Inj 5-FU _____ mg iv bolus Inj.tid 2-3 min	_____	_____
Efter 30 - 40 min:		
Inj Calciumfolinat <u>100 mg</u> iv bolus Inj.tid 2-5 min	_____	_____

Peroral profylax **Ssk.sign**

Antiemetikaschema nr 3.	_____
--------------------------------	-------

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____