

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata

Kur: \_\_\_\_\_

Yta: \_\_\_\_\_

**FOLFIRI (Irinotekan/DeGramont)**

(GI)

Inf Irinotekan	180 mg/m <sup>2</sup>		Dag 1
Inf Calciumfolinat	200 mg/m <sup>2</sup>	(jämna 50-tal)	Dag 1
Inj 5-FU	400 mg/m <sup>2</sup> bolus	(jämna 50-tal)	Dag 1
Inf 5-FU	2800 mg/m <sup>2</sup> /46 h	(jämna 100-tal)	Dag 1 till 3

**Inför varje kur:** Blodstatus, Neutr.**Cykelintervall:** 14 dagar.**Efter kur:** Antiemetikaschema nr 3 med start dag 2 i kuren.**Förse** patienten med Loperamidschema.**DAG 1** beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej **Ssk.sign** **Läk.sign****Inj Betapred** 8 mg iv \_\_\_\_\_**Inj Ondansetron** 8 mg iv \_\_\_\_\_**Inj Atropin** 0.25 mg sc \_\_\_\_\_

Irinotekan och Calciumfolinat startas samtidigt!

*Kan kopplas ihop och ges med samma pump.***Inf Irinotekan** \_\_\_\_\_ mg iv i 500 ml NaCl Inf.tid 1 tim

Start \_\_\_\_\_

Stopp \_\_\_\_\_

**Inf Calciumfolinat** \_\_\_\_\_ mg iv i 500 ml NaCl Inf.tid 1 tim

Start \_\_\_\_\_

Stopp \_\_\_\_\_

**Inj 5-FU** \_\_\_\_\_ mg iv bolus Inj.tid 2-3 min \_\_\_\_\_**Inf 5-FU** \_\_\_\_\_ mg Kontinuerlig Infusionspump 46 tim \_\_\_\_\_

Start \_\_\_\_\_

**Peroral profylax****Ssk.sign****Antiemetikaschema nr 3.** \_\_\_\_\_**DAG 3****Ssk.sign**

Patienten kommer åter för bortkoppling av den kontinuerliga infusionen \_\_\_\_\_

Godkänd av: \_\_\_\_\_ Läkarens underskrift: \_\_\_\_\_