

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

FuMi (kontinuerligt 5-FU dropp)
(Analcancer, samtidigt med strålning)

Inj Mitomycin	10 mg/m ²	Dag 1
Inf 5-FU	1000 mg/m ² /dygn	Dag 1-4 eller
	750 mg/m ² /dygn	Dag 1-5

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Cykelintervall: Hela första (om 1 FuMi; se journal) och hela sista behandlingsveckan (om 2 FuMi; se journal) med strålning samtliga dagar. Fyra eller 5 dagar avgörs av hur många dagar som kan ges samtidigt med strålning. Intervallet vid 2 FuMi-kurer blir normalt 28 dagar om strålningen startar en måndag vilket ska vara klinisk rutin.

Dosreduktion: 2a FuMi-kuren reduceras vid behov enligt klinisk erfarenhet utifrån tolerans för kur 1 samt med vägledning av dosreduktionsschemat.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

Inj Betapred 8 mg iv	_____	_____
Inj Ondansetron 8 mg iv	_____	_____
Inj Mitomycin _____ mg iv bolus Inf.tid 2-5 min	_____	_____
Inf 5-FU _____ mg iv i 1000 ml NaCl Inf.tid 24 tim	_____	_____
	Start _____	_____
	Stopp _____	_____

DAG 2 beställs till kl _____ **Ssk.sign Läk.sign**

Inj Betapred 4 mg iv	_____	_____
Inf 5-FU _____ mg iv i 1000 ml NaCl Inf.tid 24 tim	_____	_____
	Start _____	_____
	Stopp _____	_____

DAG 3 beställs till kl _____ **Ssk.sign Läk.sign**

Inj Betapred 4 mg iv	_____	_____
Inf 5-FU _____ mg iv i 1000 ml NaCl Inf.tid 24 tim	_____	_____
	Start _____	_____
	Stopp _____	_____

DAG 4 beställs till kl _____ **Ssk.sign Läk.sign**

Inf 5-FU _____ mg iv i 1000 ml NaCl Inf.tid 24 tim	_____	_____
	Start _____	_____
	Stopp _____	_____

OBS! Endast vid 5-dagars schema

DAG 5 beställs till kl _____ **Ssk.sign Läk.sign**

Inf 5-FU _____ mg iv i 1000 ml NaCl Inf.tid 24 tim	_____	_____
	Start _____	_____
	Stopp _____	_____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____