

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

FuMi (5-FU pump)

(Analcancer, samtidigt med strålning)

Inj Mitomycin	10 mg/m ²	Dag 1
Inf 5-FU } }	1000 mg/m ² /dygn 750 mg/m ² /dygn	Dag 1-4 eller Dag 1-5

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Cykelintervall: Hela första (om 1 FuMi; se journal) och hela sista behandlingsveckan (om 2 FuMi; se journal) med strålning samtliga dagar. Fyra eller 5 dagar avgörs av hur många dagar som kan ges samtidigt med strålning. Intervall vid 2 FuMi-kurer blir normalt 28 dagar om strålningen startar en måndag vilket ska vara klinisk rutin.

Dosreduktion: 2a FuMi-kuren reduceras vid behov enligt klinisk erfarenhet utifrån tolerans för kur 1 samt med vägledning av dosreduktionsschemat.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 2 med start dag 2 i kuren.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

Inj Ondansetron 8 mg iv _____

Inj Betapred 8 mg iv _____

Inj Mitomycin _____ mg iv bolus. Inj.tid 2-5 min _____

Totaldos 5-FU per dygn _____ mg

Inj 5-FU _____ mg iv. Kontinuerlig infusionspump på 4 eller 5 dygn _____
(ringa in aktuellt antal dygn) Start _____

Peroral profylax**Ssk.sign**

Antiemetikaschema nr 2. _____

DAG 5 eller 6 (ringa in rätt antal dagar)**Ssk.sign**

Patienten kommer åter för bortkoppling av den kontinuerliga infusionen _____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____