

Bevacizumab + FLV

Bevacizumab (Avastin)	5 mg/kg (om lämpligt, jämna 100-tal)	iv inf 90/60/30 min	Dag 1
5-Fluorouracil	500 mg/m ² (jämna 50-tal)	iv bolus 2-3 min	Dag 1-2
Calciumfolinat	100 mg	iv bolus 2-5 min	Dag 1-2

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Före administrering:

Ta urinsticka dagen före eller samma dag som kur, om proteinuri (>+1) avvakta med inf Bevacizumab och kontakta läkare! Vg se under fliken kontrollschema vid proteinuri vid Bevacizumab behandling.

Om blodtrycket > 150/90 avvakta med inf Bevacizumab och kontakta läkare!

Ge inf Bevacizumab nr 1 på 90 min, om det går bra; ge inf nr 2 på 60 min, om det går bra; ge fortsatta infusioner på 30 min.

Bevacizumab kan ges före eller efter cytostatikabehandlingen.

OBS! Risk för gastrointestinal perforation, sämre sårhelingsprocess (minst 5 veckors uppehåll till planerad operation).

Cykelintervall 14 dagar.

Utvärderingsintervall efter 4 kurer.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

Dosreduktion:

B-LPK (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	5-FU	Calciumfolinat
>3,0	>100	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	100%
2,4-2,0	74-50	50%	100%
<2,0	<50	Beh uppskjutes en vecka	