

Loperamidschema

Du har fått behandling med ett cytostatika som heter Irinotekan eller Topotekan (Hycamtin) och en av biverkningarna kan vara fördröjd diarré, dvs den kommer efter mer än 24 timmar efter avslutad infusion.

Du får med dig hem tabletter för att stoppa diarrén.

Börja med 2 tabletter (4 mg) loperamid, (tex Imodium, Dimor, Travello) som du börjar med om du får fördröjd diarré. Sedan fortsätter du med 1 tablett varannan timme. Fortsätt med det minst 12 timmar efter den sista flytande avföringen och MAX 48 timmar i följd.

Drick mycket vatten eller vätskeersättning (sodavatten, näringsdryck, soppa eller avslagen kolsyrad dryck) om du får diarréer.

Du ska ta kontakt med den vårdenhet som behandlar dig om:

- Du har illamående och kräkningar samt diarré
- Du har feber och diarré

Kontakta ditt sjukhus (din vårdenhet) om du fortfarande 48 timmar efter start med loperamid har diarréer.

Denna medicin ska du endast ta om du fått diarréer, tas den i förebyggande syfte finns risk för förstoppning.

Ring din vårdande enhet _____ dagtid på telenr: _____

Kvällar och helger _____ på telenr: _____