

Cisplatin/ Gemcitabin (blåscä)

Gemcitabin	1000 mg/m ²	iv inf 30 min	Dag 1, 8 och 15
Cisplatin	70 mg/m ²	iv inf 2 tim	Dag 2

Inför kur 1: P Cystatin C och Audiogram.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea, Cystatin C.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Under kur Dag 2: Vikt x 2. Inj/T Furix 40 mg vid viktökning >2 kg.

Före behandlingsstart:

Njurfunktionskontroll (P Cystatin C eller kreatininclearance eller Iohexolclearance). Om fullgod njurfunktion kan enbart kreatinin följas vid enstaka följande kurer, men om flertal kurer skall ges eller om nedsatt njurfunktion-alternativt vid signifikant kreatininstegegring- skall ny njurfunktionskontroll utföras.

Vid nedsatt njurfunktion individuell dosering av Cisplatin.

Kontroll av audiogram innan Cisplatinbeh.

Cisplatin gives med forcerad diures.

Aminoglykosid skall ej givas under eller inom en månad efter Cisplatin-behandling. Om njurfunktionen är normal kan det sedan användas vid behov.

Cykelintervall 28 dagar.

Utvärderingsintervall efter 4 cykler.

Efter kur: dvs Dag 3: Antiemetikaschema nr 6.

Dag 9 och 16: Antiemetikaschema nr 1.

Om GFR är < 70 ml/min skall cisplatin reduceras enligt schema.

Dosreduktion:

GFR	Cisplatin
60-69	75%
<60	Se regim Karboplatin/Gemcitabin

OBS! om den nedsatta njurfunktionen beror på tumörobstruktion gives fulldos cisplatin

Dosreduktion:

B-LPK (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Gemcitabin	Cisplatin
>3,0	>100	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	100%
≤2,4	74-50	Beh uppskjutes 7 dagar	