

## Paklitaxel/Cisplatin/Gemcitabin (TCG) (Blåska)

<b>Paklitaxel</b>	80 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 3 tim	Dag 1 och 8
<b>Cisplatin</b>	70 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 1 tim	Dag 1
<b>Gemcitabin</b>	1000 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 30 min	Dag 1 och 8

Inför kur 1: Audiometri, Krea.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea, P Cystatin.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Kur 1-2: Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT. Läkare ska vara tillgängliga de första 10 min av infusionstiden.

**För att minska risken för akuta infusionsreaktioner skall kur 1 och 2 med Paklitaxel ges enligt följande:** Starta infusionen med hastigheten 50 ml/timme under de första 15 minuterna. Om ingen reaktion uppträder ökas infusionshastigheten sedan under påföljande 15 min till den dubbla. Om ingen reaktion uppträtt under de första 30 minuterna ges resterande mängd infusion med ordinarie hastighet.

Före behandlingsstart: Njurfunktionskontroll (P Cystatin C eller kreatininclearance eller Iohexolclearance). Om fullgod njurfunktion kan enbart kreatinin följas vid enstaka följande kurer, men om flertal kurer skall ges eller om nedsatt njurfunktion-alternativt vid signifikant kreatininstegring skall ny njurfunktionskontroll utföras. Vid nedsatt njurfunktion individuell dosering av Cisplatin. Kontroll av audiogram innan Cisplatinbeh. Cisplatin ges med forcerad diures. Aminoglykosid skall ej givas under eller inom en månad efter Cisplatin-behandling. Om njurfunktionen är normal kan det sedan användas vid behov.

PVC fritt filter och aggregat.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall efter 4 cykler.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 6. Dag 9: Antiemetikaschema nr 1.

Om GFR är < 70 ml/min skall cisplatin reduceras enligt schema.

Dosreduktion:

GFR ml/min	Cisplatin
60-69	75%
<60	Cisplatin ersätts med Karboplatin doserat enligt Calverts formel

**OBS!** om den nedsatta njurfunktionen beror på tumörobstruktion gives fulldos cisplatin

Dosreduktion:

B-Neutr (x10 <sup>9</sup> /L)	B-LPK (x10 <sup>9</sup> /L)	B-TPK (x10 <sup>9</sup> /L)	Gemcitabin, Paklitaxel	Cisplatin
>1,5	>3,0	>100	100%	100%
1,0 – 1,4	2,9-2,5	99-75	75%	75%
<1,0	≤2,4	74-50	Beh uppskjutes 7 dagar	