

## Vinflunin (URO)

<b>Vinflunin</b> (Javlor)	320 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 20 min	Dag 1
<b>*Vinflunin</b> (Javlor)	280 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 20 min	Dag 1

\* Reducerad startdos 280 mg/m<sup>2</sup> efter tidigare bäckenbestrålning, tidigare cytostatika eller nedsatt performance status = 1. Ges *ej* med performance status >1.

I avsaknad av hematologisk toxicitet under första cykeln, med behandlingsförsening eller dosreduktion, ökas dosen till 320 mg/m<sup>2</sup> var tredje vecka för följande cykler.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Ge patienten info om att det är förstoppande.

För att förhindra förstoppning rekommenderas laxativa och dietåtgärder inklusive riklig tillförsel av dryck från dag 1 till dag 5 eller 7 efter varje vinfluninadministrering

Cykelintervall: 21 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

### Dosreduktion:

<b>B-LPK (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>B-TPK (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>Vinflunin</b>
≥ 2,5	> 100	100%
< 2,5	< 100	Uppskjuten beh till återhämtning

Vid grad 2 förstoppning, definierat som förstoppning som kräver laxativ, i 5 dagar eller mer, eller grad ≥ 3 oavsett duration, ska vinflunindosen justeras.