

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata

Kur: \_\_\_\_\_

Yta: \_\_\_\_\_

## Vinflunin (URO)

Inf Vinflunin (Javlor)*	320 mg/m <sup>2</sup>	Dag 1
-------------------------	-----------------------	-------

\* Reducerad startdos 280 mg/m<sup>2</sup> efter tidigare bäckenbestrålning, tidigare cytostatika eller nedsatt performance status = 1. Ges *ej* med performance status >1.

I avsaknad av hematologisk toxicitet under första cykeln, med behandlingsförsening eller dosreduktion, ökas dosen till 320 mg/m<sup>2</sup> var tredje vecka för följande cykler.

**Inför varje kur:** Blodstatus, Neutr.

**Cykelintervall:** 21 dagar.

**Efter kur:** Antiemetikaschema nr 1.

**Ge** patienten info om att det är förstoppande. Rikligt med dryck och ev. laxativ dag 1-5 eller 7.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej **Ssk.sign** **Läk.sign**

**Po. tas 1 tim före behandling**

**T/ Inj Betapred 8 mg po/iv** \_\_\_\_\_

**Inf Vinflunin** \_\_\_\_\_ mg iv i 100 ml NaCl Inf.tid 20 min \_\_\_\_\_

Start  
Stopp

Godkänt av: \_\_\_\_\_ Läkarens underskrift: \_\_\_\_\_