

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata

Kur: \_\_\_\_\_

Vikt: \_\_\_\_\_ kg

## Bevacizumab

(Njurca.)

Inf Bevacizumab (Avastin)

15 mg/kg

Dag 1 var 3:e vecka

Ev. i kombination med Interferon (PegIntron)

**Inför varje kur:** Blodstatus, Neutr.

**Ta** urinsticka dagen före eller samma dag som kur, om proteinuri (>+1) avvakta med inf Bevacizumab och kontakta läkare! Vg se under fliken kontrollschema vid proteinuri vid Bevacizumab behandling.

**Om** blodtrycket > 150/90 avvakta med inf Bevacizumab och kontakta läkare!

**Ge** inf Bevacizumab nr 1 på 90 min, om det går bra; ge inf nr 2 på 60 min, om det går bra; ge fortsatta infusioner på 30 min.

Ge första infusionen före cytostatika, resterande infusioner kan ges före eller efter.

**OBS!** Risk för gastrointestinal perforation, sämre sårhelingsprocess.

**Cykelintervall:** 21 dagar.

**Efter kur:** Antiemetikaschema nr 1.

**DAG 1**

beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej

**Ssk.sign**

**Läk.sign**

BT \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ U-protein \_\_\_\_\_

**Inf Bevacizumab** \_\_\_\_\_ mg iv i 100 ml NaCl , inf.tid 90/60/30 min

Start \_\_\_\_\_

Stopp \_\_\_\_\_

Godkänt av: \_\_\_\_\_ Läkarens underskrift: \_\_\_\_\_