

# Hepatocellulär cancer i Sydöstra sjukvårdsregionen

## Kurativ behandling

### Neoadjuvant behandling

Bör endast ges inom ramen för studier.

### Kirurgisk/interventionella behandlingar

Aktuellt för patienter *utan* extrahepatisk spridning. Det finns ett flertal olika metoder. Alla patienter bör diskuteras på multidisciplinär konferens.

### Adjuvant behandling:

Bör endast ges inom ramen för studier

## Palliativ behandling

När kirurgiska/interventionella behandlingar ej längre är möjliga kan palliativ onkologisk behandling vara indicerad.

### Generellt

Behandling med **tyrosinkinashämmare** är förknippade med en del toxicitet. Vanligast är hypertoni, hand-fot syndrom, diarré, fatigue och trombocytopeni.

OS-vinsten i studierna ligger på runt 2-3 månader (TKI vs BSC). Det är därför viktigt att man är tydlig gentemot patienter kring vad den eventuella nyttan förväntas vara samt att rätt patient selekteras för behandling. I allmänhet är det bara patienter med CP A och PS 0-1 som anses ha nytta av palliativ onkologisk behandling (se detaljer nedan).

### Två kriterier av särskild vikt

(bör vara etablerade redan vid MDK-diskussion *och* journalföras vid nybesök):

1. Child Pugh (var god se tabell nedan)
2. Performancestatus

| Parameter         | Poäng |               |              |
|-------------------|-------|---------------|--------------|
|                   | 1     | 2             | 3            |
| Bilirubin umol/l  | < 35  | 35–51         | > 51         |
| PK                | < 1,7 | 1,7–2,2       | > 2,2        |
| Albumin g/l       | > 35  | 28–35         | < 28         |
| Ascites           | Ingen | Lättbehandlad | Måttlig/svår |
| Encefalopati grad | Ingen | 1 och 2       | 3 och 4      |

Child-Pugh A: 5–6 poäng, Child-Pugh B: 7–9 poäng, Child-Pugh C: > 9 poäng

### **1:a linjens palliativa behandling**

**Lenvatinib/Lenvima:** CP A, PS 0-1

*REFLECT-studien:* Lenvima vs Nexavar - OS 13,6 vs 12,3 mån, PFS 7,3 vs 3,6 mån

**Sorafenib/Nexavar:** CP A (i undantagsfall B), PS 0-2

*SHARP-studien:* Nexavar vs placebo - OS 10,7 vs 7,9 mån, PFS 5,5 vs 2,8 mån

### **2:a linjens palliativa behandling**

**Regorafenib/Stivarga:** CP A, PS 0-1. (Bör ha tolererat minst 400 mg Sorafenib i minst 20 dagar under sista behandlingsmånaden.)

*RESORCE-studien:* Stivarga vs placebo - OS 10,6 vs 7,8 mån, PFS 3,1 vs 1,5 mån