

Minskning av väntetid till kolposkopimottagning

Kvinnokliniken Linköping/Motala och Kvinnokliniken Norrköping

Detta ville vi uppnå/åstadkomma

Vi ville minska väntetiden till kolposkopi genom att öka antalet läkare som utför kolposkopi.

Triagera ut patienter som inte har behov av kolposkopi genom att kalla till cellprov med dubbelanalys 18 månader istället för kolposkopi 24 månader.

Målet är att kunna kalla patienter i rätt tid.

Detta är våra mätningar och resultat

Cytologprov istället för kolposkopi

- Totalt 112 patienter
- 77 återgick till screening/kontrollfil
- 22 till kolposkopi
- 13 uteblev

Samma nivå av kvalitet eller patientnöjdhet när besöks utförs av ST-läkare istället för specialist.

Så här gjorde vi

Gaffelmottagning för ST-läkare (en seniorläkare som finns tillgänglig för ST-läkare under upplärning).

Patienter som har uppfyllt vissa kriterier kallas till cellprov med dubbelanalys istället för kolposkopi. Om kvarstående förändringar kallas patienten till kolposkopi, om förändringarna är utläkta återgår patienten till screening.

Nästa steg, lärdomar och medskick

Förslag om att införa triageringen som standardiserad handläggning, men att utesluta patienter som tillhör kontrollfil.

Kontinuerlig utbildning av ST-läkare.

